



Generalitat de Catalunya Departament de Salut

Vigilància conductual del VIH/ITS en homes que tenen sexe amb homes (HSH) a Catalunya.

Resultats de l'estudi quantitatiu SIALON ^[1]

Ferrer L¹, Folch C¹, Muñoz R^{1,2}, Zaragoza K², Casabona J¹

ifs.ceescat.germanstria@gencat.cat ; cft.ceescat.germanstria@gencat.cat

1. Centre d'Estudis Epidemiològics sobre ITS/sida de Catalunya (CEEISCAT); Ciber de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España. 2. StopSida
Àrea: Malalties transmissibles

INTRODUCCIÓ

El 2008 es du a terme el projecte Sialon que forma part del monitoratge conductual en homes que tenen sexe amb homes (HSH) que realitza el CEEISCAT des del 1993 i que s'inclou dins del Sistema Integrat de Vigilància Conductual del VIH/ITS de Catalunya (SIVES). Sialon pretén consolidar una xarxa d'institucions que treballen la vigilància epidemiològica del VIH/ITS perquè formin part d'una estratègia integrada de prevenció d'aquestes infeccions a nivell europeu i que promou l'ús d'indicadors consensuats (indicadors UNGASS) ^[2].

❖ **Objectiu:** Obtenir informació vàlida i fiable sobre la prevalença del VIH, sífilis, conductes de risc i factors culturals en HSH mitjançant mètodes de recollida no invasius, en països del sud i est d'Europa.


RESULTATS

o L'edat mitjana dels enquestats és de 38 anys,
o ¼ part dels enquestats són estrangers (28%), majoritàriament provinents de Llatinoamèrica (68%).


o En els últims 12 mesos:

- 5 de cada 6 enquestats havien accedit a preservatius gratuïts i sabien on fer-se el test (UNGASS 9) i almenys un 15% havien tingut una ITS,
- El 60% s'havien fet el test del VIH i coneixien el resultat (UNGASS 8)

Penetració anal desprotegida segons serostatus de la parella estable (últims 6 mesos), 2008



Ús consistent del preservatiu segons tipus de pràctica i de parella (últims 6 mesos), 2008



MATERIAL I MÈTODES


Estudi transversal mitjançant la implementació d'un qüestionari i recollida de mostra biològica.

- ❖ **Població d'estudi:** HSH que freqüenten llocs de trobada gai que han tingut alguna relació sexual amb homes els darrers 12 mesos.
- ❖ **Mostreig i mostra:** Identificació de zones de freqüentació gai i mostreig probabilístic, anomenat *Time Location Sampling*, mitjançant un calendari de dies i hores predefinit. 400 HSH.
- ❖ **Instrument:** qüestionari d'autocomplimentació, voluntari, confidencial i anònim distribuït cara a cara.
- ❖ **Eines estadístiques:** programa estadístic SPSS per l'anàlisi de les dades recollides.

Comportament sexual dels últims 6 mesos

Tipus i número de parelles	mitjana	%
Més de 10 parelles masculines (n=318)		38,4
Parelles sexuals femenines (n=360)		15
Parella estable (n=386)	1,6	53,4
Parella ocasional (n=394)	19,5	83

Consum de drogues abans o durant la relació sexual (últims 6 mesos), 2008



- o La prevalença del VIH en HSH és d'un 17%,
- o El 44% no havien estat diagnosticats

CONCLUSIONS

- ✓ Davant l'existència de conductes sexuals de risc es fa necessari reforçar la prevenció a la infecció del VIH/ITS.
- ✓ És important incidir en estratègies per conscienciar els HSH de la vinculació existent entre el consum de drogues i una més alta prevalença de pràctiques sexuals de risc.
- ✓ És destacable el número d'homes que no han estat diagnosticats del VIH tot i estar infectats, fent necessària la promoció del test del VIH en aquest col·lectiu.

^[1] "The Capacity building in HIV/Syphilis prevalence estimation using non-invasive methods among MSM in Southern and Eastern Europe el projecte SIALON ha estat finançat per la Comissió Europea del Programa de Salut pública de la Comissió Europea 2003-2008."

^[2] Seguimiento de la declaración de compromiso sobre el VIH/Sida: Directrices para el desarrollo de indicadores básicos. Informe 2010. ONUSIDA, 2009

