

III Jornades Internacionals Comunicació i Salut
22 de novembre del 2018

#ParlemdeVIH?

incom UMB

Influencia de los medios de comunicación sobre la salud pública en el abordaje del ChemSex

Dr. Percy Fernández Dávila

Àrea de Investigació, Stop Sida



Centre d'Estudis Epidemiològics
sobre les Infeccions de Transmissió
Sexual i Sida de Catalunya

Investigación y publicaciones sobre el consumo de drogas en hombres gays, bisexuales y otros HSH



DROGAS, SEXO MÁS SEGURO Y
RIESGO DE INFECCIÓN POR EL VIH

RESPONSABLE
LAS FIESTAS DE SEXO:
Un emergente ambiente de riesgo para la
transmisión del VIH y otras infecciones de
Transmisión Sexual

2011



RESUMEN
En España, durante los últimos meses del 2015, se ha hablado y discutido mucho, sobre todo en los me-
dios de comunicación, acerca del fenómeno del ChemSex. Si bien el uso de drogas para tener sexo entre
hombres gays no es nuevo ni reciente, el ChemSex hace alusión al consumo intencional de drogas para
tener relaciones sexuales durante mucho tiempo. Sin embargo, incluso hasta ahora, mucha de la informa-
ción que se ve refleja contiene una serie de imprecisiones respecto a la terminología, al alcance de este fenó-
meno, las drogas que se consumen y los espacios en que se consumen. Este artículo busca entender la
emergencia de este fenómeno desde una visión integral y holística, así como plantea una definición desde
una perspectiva de la reducción de riesgos para la prevención del VIH, de otras ITS y para el cuidado de la
salud sexual y de la salud en general. Finalmente, se plantean algunas consideraciones para abordar al
ChemSex a nivel preventivo.

Palabras clave: hombres que tienen sexo con hombres, hombres gays, ChemSex, drogas recreativas, con-
sumo de drogas, conductas de riesgo, reducción de riesgos, infección por el VIH




**ChemSex en España: Reflexiones sobre buena praxis
y lecciones aprendidas**
Percy Fernández Dávila
E-mail de correspondencia: percyf@gmail.com

Desde hace más de dos años, el ChemSex (el
consumo de drogas para tener relaciones sexuales
durante un período largo de tiempo entre hombres
gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con
hombres) ha estado generando mucha atención
en diferentes sectores. Antes de ello, nunca había
causado tanto interés, cuando esta práctica ha esta-
do presente en la vida de muchos hombres gays des-
de hace ya bastante tiempo. Sin embargo, si se com-
para el ChemSex como un "fenómeno emergente",
sería por: (1) cierta forma en cómo se practica, que
tiene que ver con la duración (mucho más tiempo de
lo que solía ser), (2) la gran diversidad de drogas que



**CONSUMO DE DROGAS Y
SU RELACIÓN CON EL
SEXO:**
Escuchando las voces de un
grupo de hombres gays y
bisexuales de la ciudad de
Barcelona que practican
ChemSex
Percy Fernández-Dávila

Alerta (10/9/2014): Ingreso de la tina a España entre hombres gays



Clear Links Between Starting Methamphetamine and Increasing Sexual Risk Behavior: A Cohort Study Among Men Who Have Sex With Men

Martin Hoenigl, MD,*†‡ Antoine Chaillon, MD,* David J. Moore, PhD,§ Sheldon R. Morris, MD,* Davey M. Smith, MD,*§|| and Susan J. Little, MD*

Background: It remains unclear if methamphetamine is merely associated with high-risk behavior or if methamphetamine use causes high-risk behavior. Determining this would require a randomized controlled trial, which is clearly not ethical. A possible surrogate would be to investigate individuals before and after starting the use of methamphetamine.

Methods: We performed a cohort study to analyze recent self-reported methamphetamine use and sexual risk behavior among 8905 men who have sex with men (MSM) receiving the "Early Test," a community-based HIV screening program in San Diego, CA, between April 2008 and July 2014 (total 17,272 testing encounters). Sexual risk behavior was evaluated using a previously published risk behavior score [San Diego Early Test (SDET) score] that predicts risk of HIV acquisition.

Results: Methamphetamine use during the last 12 months (hereafter, recent-meth) was reported by 754/8905 unique MSM (8.5%). SDET scores were significantly higher in the 754 MSM with recent-meth use compared with the 5922 MSM who reported that they have never used methamphetamine ($P < 0.001$). Eighty-two repeat testers initiated methamphetamine between testing encounter, with significantly higher SDET scores after starting methamphetamine [median 5 (interquartile range, 2–7) at recent-meth versus median 3 (interquartile range, 0–5) at never-meth; $P < 0.001$, respectively].

Conclusions: Given the ethical impossibility of conducting a randomized controlled trial, the results presented here provide the strongest evidence yet that initiation of methamphetamine use increases sexual risk behavior among HIV-uninfected MSM. Until more effective prevention or treatment interventions are available for methamphetamine users, HIV-uninfected MSM who use methamphetamine may represent ideal candidates for alternative effective prevention interventions (ie, preexposure prophylaxis).

Key Words: MSM, risk behavior, methamphetamine, SDET score, recreational drugs, stimulants

(*J Acquir Immune Defic Syndr* 2016;71:551–557)

Received for publication August 12, 2015; accepted October 21, 2015.
From the *Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, University of California San Diego (UCSD), La Jolla, San Diego, CA; †Section of Infectious Diseases and Tropical Medicine, Department of Internal Medicine, Medical University of Graz, Graz, Austria; ‡Division of



BMJ 2015;351:h5790 doi: 10.1136/bmj.h5790 (Published 3 November 2015)

Page 1 of 2



EDITORIALS

What is chemsex and why does it matter?

It needs to become a public health priority

Hannah McCall senior nurse, genitourinary medicine/sexual and reproductive health¹, Naomi Adams head of sexual health psychology¹, David Mason specialist substance misuse practitioner², Jamie Willis outreach and training manager³

¹Central and Northwest London NHS Foundation Trust, London WC1E 6JB, UK; ²Camden and Islington NHS Foundation Trust, London, UK; ³Antidote Service, London Friend, London, UK

"Chemsex" is used in the United Kingdom to describe intentional sex under the influence of psychoactive drugs, mostly among men who have sex with men. It refers particularly to the use of mephedrone, γ -hydroxybutyrate (GHB), γ -butyrolactone (GBL), and crystallised methamphetamine. These drugs are often used in combination to facilitate sexual sessions lasting several hours or days with multiple sexual partners.^{1,2}

Mephedrone and crystal meth are physiological stimulants, increasing heart rate and blood pressure, as well as triggering euphoria and sexual arousal. GHB (and its precursor GBL) is a powerful psychological disinhibitor and also a mild anaesthetic. Anecdotal reports and some small qualitative studies in the UK find that people engaging in chemsex report better sex, with these drugs reducing inhibitions and increasing pleasure. They facilitate sustained arousal and induce a feeling of instant rapport with sexual partners. Some users report using them to manage negative feelings, such as a lack of confidence

service for the lesbian, gay, bisexual, transgender community in London, around 64% of attendees seeking support for drug use reported using chemsex drugs in 2013–14.³ Of crystal meth and GHB/GBL users, most reported using them to facilitate sex, with around three quarters reporting injecting drug use.³

Harms to health

Mental health services are seeing a small but important uptake in services by chemsex drug users.⁴ Mephedrone and crystal meth can create a powerful psychological dependence, with GHB/GBL creating a dangerous physiological dependence. Mental health effects may require treatment and can become permanent.⁵ Some users will need drug treatment to support detoxification, particularly from GHB/GBL.⁵

Chemsex drug users often describe "losing days"—not sleeping or eating for up to 72 hours^{6,7}—and this may harm their general health. Users may present too late to be eligible for

HUFFPOST LIFESTYLE
UNITED KINGDOM

Edition: UK Facebook Like 12% Twitter Follow Newsletters Huffington Post Search

INDEPENDENT News, Voices, Culture, Lifestyle, Tech, Sport

theguardian

home UK world sport football opinion culture business lifestyle fashion environment tech travel browse all sections

home UK society law scotland wales northern ireland education media

Chemsex
The Observer

Addicted to chemsex: 'It's a horror story'

An increasing number of gay men are taking part in multi-day, drug-fuelled orgies – despite the health risks. Paul Flynn reports on a powerful new documentary, and what it says about love and loneliness

Paul Flynn
Sunday 22 November 2015 08:00 GMT

HOME » NEWS » HEALTH » HEALTH NEWS

Chemsex: the alarming new trend of 72 hour drug-fuelled sex sessions

NHS staff have warned of the growing rise of 'chemsex' where people embark on dangerous drug-fuelled sex sessions with an average of five partners

Facebook 2K Twitter Pinterest 0 LinkedIn 13 Reddit 2K Email

SMART CAR CHARGER



ABC Sociedad ara.cat

ESPAÑA INTERNACIONAL

LA VANGUARDIA societat

Lunes, 16 de noviembre 2015

Portada Internacional Política Magazine M

'Chemsex': maratón de drogas i sexe, la nova pràctica de risc

Les ONG que treballen en l'àmbit del VIH temen que sigui una nova via de propagació del virus

LARA BONILLA Barcelona ACTUALITZADA EL 05/11/2015 00:00

Twitter Facebook + 120 10 Email Print

Chemsex: S
Las drogas del ámbito d sexual de riesgo entre hor

Vida | 11/11/2015 - 01:00h | Última ac

Las drogas sintéticas, en auge LV

SUSANA QUADRADO | Segu Barcelona

El chemsex es practica en l'ambient privat, són festes en pisos particulars que s'organitzen via aplicació mòbil. / GETTY

SÍGUENOS EN Facebook Twitter Google+ LinkedIn Instagram

VICIOS EDICIONES ABCSEVILLA

Segs

La Vanguardia TV | Fotos | Listas

Participación Hemeroteca Servicios

Catalunya Religió

Vida

Artículo de LA VANGUARDIA

Publicidad

horra
Noche
Elige 8 horas
Verano
Invierno
Fin de Semana

IBERDROLA
Allí estaré

Publicidad

ÉROE PARA TU MA INMUNITARIO

CÓDIGO NUEVO ACTUALIDAD VIDA DINERO ENTRETENIMIENTO DEPORTES MUSICA HUMOR AGENDA

Me Infiltré En Una 'Chemsex' Y Vi Sexo, Drogas Y Una Crudeza Casi Animal

657

Madrid. Mediados de octubre. Llevo diecisiete minutos esperando delante de una de esas paraderitas que parecen más bien templos de alabanza a la harina. Aprieta el hambre. Me decido por dos empanadillas de espinacas con piñones. Miro el reloj. **Alguien debería aparecer pronto para hablarme** de esa palabra que, hasta hace unos días, faltaba en mi diccionario: 'chemsex'.

Nuevo Audi Q2 por 170€ /m. ¿Qué tan **autodirigido** sería el?

TESTIGO DIRECTO

Drogas, sexo y vicio a oscuras: me colé en una 'sex party' gay y esto fue lo que pasó

JAVIER TERREM 31 OCT 2018 12:37

Los profiles se llenan de hombres semidesnudos. / JAVIER TERREM

*** Nos colamos en el KitKatClub, la fiesta porno que arrasa en Berlín**

Tarde de un sábado de octubre y lo único que da vueltas en mi cabeza es pensar en el plan estipulado para pasar la noche. No he estado en ningún sitio parecido antes y, por si no estoy ya suficientemente nervioso, repaso una y otra vez las fotos de la *fanpage* de Facebook de la sesión discotequera a la que iré en unas horas. Mientras tanto, me tranquiliza Juan, mi mejor amigo. He decidido que sea el elegido para acompañarme porque ya conoce la fiesta, no va a sorprenderse por nada, además ha vivido muchos años en Berlín y sabe lo que nos espera en este tipo de garitos.

Solo hasta el 21 de noviembre
FINANCIACIÓN TOTAL
0% 0% BARRIO - 0% INTERÉS
TAE: 0% - TIN: 0%
150€*
EN TODOS LOS ORDENADORES
CON PROCESADOR AMD RYZEN

DIARIO MEDICO.com

25 aniversario

Inicio | **ÁREA PROFESIONAL** | ÁREA CIENTÍFICA | OPINIÓN / PARTICIPACIÓN | MULTIMEDIA | FORMACIÓN

Sanidad | Profesión | Normativa | Gestión | Entorno | La consulta |

Portada > Área Profesional > Entorno

PRÁCTICA DE RIESGO

El 'chemsex' se asocia con psicopatología, VIH y ETS

El consumo de drogas desinhibidoras y las prácticas sexuales de riesgo habituales en el *chemsex* han propiciado un aumento de adicciones y diagnósticos de ETS.

Isabel Gallardo Ponce. Madrid | igallardo@diariomedico.com | 27/03/2017 00:00

compartir

☆☆☆☆ |votat| 0 comentarios

imprimir | tamaño

Las noticias/reportajes han llevado a la construcción social del ChemSex en el imaginario popular y profesional

- El ChemSex es un fenómeno reciente.
- ChemSex sólo ocurre en fiestas privadas de sexo.
- Las fiestas privadas de sexo suelen ser de sexo en grupo.
- Las drogas que se usan para ChemSex son GHB/GBL, mefedrona o metanfetamina (tina).
- Se utilizan las apps (Grindr) para convocar o invitar a fiestas.
- Focalización en el riesgo sexual (VIH, VHC y otras ITS).
- Uso frecuente de drogas inyectadas (slam/slamming).
- Consumo problemático.
- ChemSex es un fenómeno todavía minoritario o marginal (“no hay datos”).

Estos problemas se trasladan en la investigación... (III)

Marzo, 2014

The Chemsex Study:
drug use in sexual settings among gay and bisexual men in Lambeth, Southwark & Lewisham

Adam Bourne
David Reed
Ford Hickson
Sergio Torres Rueda
Peter Weatherburn

Sigma
Lambeth, Southwark & Lewisham

Participants in this study had to have used one or more of three key drugs – crystal methamphetamine (crystal meth or tina), GHB/GBL (G), and mephedrone – either immediately before, or during sex with other men within the last 12 months.

State of Play:
findings from the England Gay Men's Sex Survey 2014

Ford Hickson
David Reid
Gary Hammond
Peter Weatherburn

	Use in last 4 wks, entire England sample (%)
Cocaine	6.6
Ecstasy	5.7
Mephedrone	5.3
GHB/GBL	3.2
Crystal meth	2.0

Original Research Report

REVIEW

Illicit drug use and its association with sexual risk behaviour among MSM: more questions than answers?

G.J. Melendez-Torres^a and Adam Bourne^b

Purpose of review
Illicit drug use before or during sex – known as sexualized drug use (colloquially ‘chemsex’ or ‘party and play’) – has evolved as novel psychoactive substances have entered the market in many parts of the world. Here, we review key conceptual issues in associations between illicit drug use and sexual risk-behaviour in MSM.

Recent findings
Although many studies have confirmed that MSM use drugs with greater prevalence than the general population, evidence is of variable quality and a sampling frame is difficult to establish. Moreover, psychosocial hypotheses linking drug use and sexual risk, including cognitive escape and sensation seeking, are unsatisfactory and generally ignore strategic use of drugs for sexual aims. Person-level associations between drug use history and both sexual risk behaviour and HIV infection tend to be inconsistent around the world, but evidence is out of date.

Summary
There is a need for interventions for individual and cultural contexts of sexualized drug use. Trends can help clinicians in sexual health settings.

Keywords
HIV infection, illicit drug use, MSM.

Volume 29 • Number 1 • February 2016

¿Drogas sexualizadas y “drogas ChemSex”?... no se considera el factor individual

ORIGINAL STUDY

OPEN

Chemsex Among Men Who Have Sex With Men: a Sexualized Drug Use Survey Among Clients of the Sexually Transmitted Infection Outpatient Clinic and Users of a Gay Dating App in Amsterdam, the Netherlands

Susanne Drückler, MSc,* Martijn S. van Rooijen, MSc,* and Henry J.C. de Vries, MD, PhD**†‡

Objectives: Chemsex (i.e., drug use during sex) is practiced by some men who have sex with men (MSM) and is associated with high-risk behaviors. In a cross-sectional study at the sexually transmitted infection (STI) clinic of Amsterdam, we explored chemsex practices, risk behaviors, and STI prevalence.

Method: A survey on chemsex (i.e., drugs, chemicals, crystal methamphetamine, and/or neoprene) was offered to STI clinic clients during routine STI screening and to Amsterdam users of a gay online dating app. Associations were assessed using χ^2 test and multivariable regression.

Results: Chemsex in the past 6 months was practiced by 166 (17.4%) of 952 MSM clients and by 159 (3.5%) of 4567 non-MSM clients. Among gay dating app users, the proportion that reported chemsex engagement was higher than among MSM visiting the STI clinic (29.7% [137/462] vs. 17.4%, $P < 0.001$). Chemsex was a significant risk factor for bacterial STI in HIV-negative MSM visiting the STI clinic (adjusted odds ratio, 1.5, 95% CI 1.1–2.0).

HIV-negative MSM. Future interventions aim to reduce STI incidence.

© 2018 The Authors

HIV Medicine published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of British HIV Association

DOI: 10.1111/hiv.12513

HIV Medicine (2018)

ORIGINAL RESEARCH

Sexualized drug use ('chemsex') and high-risk sexual behaviours in HIV-positive men who have sex with men

El Padellà,¹ M. Kall,² M. Shalunovich,³ A. Nardone,² R. Ghani,² V. Delpech³ and H. Ward¹ on behalf of The Positive Voices study group[†]¹Department of Infectious Disease Epidemiology, Imperial College London, London, UK; ²HIV and STI Surveillance Department, Public Health England, London, UK and ³Department of Infection and Population Health, University College London, London, UK**Objectives**

The incidence of sexually transmitted infections (STI) and HIV infection remains high in gay, bisexual, and other men who have sex with men (MSM) in the UK, and sexualized drug use ('chemsex') and injecting drug use ('idms') may play a part in this. We aimed to characterize HIV-positive MSM engaging in chemsex/idms and to assess the associations with self-reported STI diagnoses and sexual behaviours.

Methods

Data from a 2014 survey of people attending HIV clinics in England and Wales were linked to clinical data from national HIV surveillance records and weighted to be nationally representative. Multivariable logistic regression assessed the associations of chemsex and idms with self-reported unprotected anal intercourse (UAI), seroconcordant UAI (sUAI) (i.e. UAI with an HIV-negative or unknown HIV status partner), sUAI with a detectable viral load (>50 HIV-1 RNA copies/mL), hepatitis C, and bacterial STIs.

Research Paper

Prevalence of drug use during sex amongst MSM in Europe: Results from a multi-site bio-behavioural survey

Magdalena Rosińska^{1,2}, Lorenzo Gios³, Christiana Nöstlinger^{3,4}, Wim Vanden Bergh^{4,5}, Ulrich Marcus⁶, Susanne Schink⁶, Nigel Sherriff⁷, Anna-Marie Jones^{8,9}, Cinta Folch⁸, Sonia Dias⁸, Inga Velicko¹⁰, Massimo Mirandola¹⁰, Salion II Network[†]¹National Institute of Public Health, National Institute of Hygiene, Chodakowska 24, 00-791 Warszawa, Poland²EMPH Regional Coordination Centre for European Project Management, Verona University Hospital, p.le Azeleto 1, 37126 Verona, Veneto Region, Italy³Institute of Tropical Medicine, Department of Public Health, Nationalstrasse 155, 2000 Antwerp, Belgium⁴Institute of Tropical Medicine, Department of Public Health, Antwerp, Belgium⁵Koblenz Institute, Senz 10, 11253 Berlin, Germany⁶School of Health Sciences, University of Brighton, Brighton, BN1 9PL, UK⁷Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Síndrom de Catalunya (CEESIC), Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Ctra de Canyet 85, 08042 Badalona, Spain⁸Global Health and Tropical Medicine, CHM, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, RUM, Universidade Nova de Lisboa, UNL, Portugal⁹Public Health Agency of Sweden, Stockholm, Sweden¹⁰Infectious Diseases Section, Department of Diagnostic and Public Health, University of Vienna, Vienna, Austria[†]University of Vienna, Faculty of Psychology, Lechnergasse 5, 1080 Vienna, Austria[†]Department of Epidemiology of Infectious Diseases, Scientific Institute of Public Health, Brescia, Belgium[†]Mil View Hospital, Sussex Education Centre, Research & Development, Brighton, UK

ARTICLE INFO

Article history:

Received 16 October 2017

Revised 16 November 2017

Accepted 4 January 2018

Available online xxx

Keywords:

MSM

Drug use

Recreational drug use

Time-location sampling

Respondent-driven sampling

Europe

ABSTRACT

Background: Substance use has been consistently reported to be more prevalent amongst Men who have Sex with Men (MSM) compared to the general population. Substance use, in particular polydrug use, has been found to be influenced by social and contextual factors and to increase the risk of unprotected intercourse among MSM. The objective of this analysis was to investigate the prevalence and predictors of drug use during a sexual encounter and to identify specific prevention needs.

Methods/design: A multi-site bio-behavioural cross-sectional survey was implemented in 13 European cities, targeting MSM and using Time-Location Sampling and Respondent-Driven Sampling methods. Multivariable multi-level logistic random-intercept model (random effect of study site) was estimated to identify factors associated with use of alcohol, cannabis, party drugs, sexual performance enhancement drugs and chemsex.

Results: Overall, 1261 (30.0%) participants reported drug use, and 436 of 1706 (11.8%) reported the use of two or more drugs during their last sexual encounter. By drug class, 966 (23.0%) reported using sexual performance enhancement drugs, 353 (8.4%) – party drugs, and 142 (3.4%) the use of chemsex. Respondents who reported drug use were more frequently diagnosed with HIV (10.5% vs. 3.9%) before and with other STIs during the 12 months prior to the study (16.7% vs. 9.2%). The use of all the analysed substances was significantly associated with sexual encounter with more than one partner.

Discussion: Substance and polydrug use during sexual encounters occurred amongst sampled MSM across Europe although varying greatly between study sites. Different local social norms within MSM communities may be important contextual drivers of drug use, highlighting the need for innovative and multi-faceted prevention measures to reduce HIV/STI risk in the context of drug use.

© 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

Definición de ChemSex (aproximación desde la salud integral, bienestar y reducción de riesgos y daños)

(Fernández-Dávila, 2016)

- Uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales por un período largo de tiempo (varias horas o días).
- Incluye un uso no-problemático y problemático.
- El elemento clave en esta definición es el tiempo.
- A mayor tiempo, mayor exposición a diversos riesgos o daños: **consumo** (intoxicación, sobredosis, aparición de síntomas psicóticos, muerte), **salud sexual** (irritación, heridas, rasgados, sangrado de la mucosa anal, de la piel del pene, fractura del pene, no uso del condón), **psicológico** (vergüenza, culpa), **social** (rechazo, expulsión, exclusión) y **material** (gasto económico excesivo, robos).

Motivos para consumir drogas en el contexto de sexo

- Intensificar o potenciar el placer sexual.
- Búsqueda de efecto estimulante: aumentar la libido (poner muy “cachondo”).
- Poner “morboso”, “cerdete” y/o “guarro” (desinhibirse sexualmente, hacer cosas que no haría de sobrio).
- Tener “largas sesiones” (muchas horas de sexo). Tener mucho aguante (“alargar el polvo”).
- Facilitar ciertas prácticas sexuales (p.e. fisting)
- Búsqueda de conexión (colegueo, formar/pertenecer a un grupo).
- Búsqueda de intimidad (en una sesión uno-a-uno).
- Situaciones personales (p.e. aliviar estados disfóricos, trabajo sexual, vivir con el VIH).

El abordaje del ChemSex desde la salud pública

Mensajes “clásicos” de la salud pública sobre el consumo de drogas

- El consumo de drogas es malo para la salud.
- “A la droga dile no”.
- Visión moralista.



Research Article

HIV Prevalence Sex with Men in

Henrique Pereira¹*, Samuel M.
¹University of Beira Interior, Portugal
²UIPES, Psychology and Health Res

Abstract

Background
infection among
associated sexu

Summary
venues for
Because HI
potential to
present an

The Role of Bathhouses and Sex Clubs in HIV Transmission *Findings From a Mathematic Model*

JOURNAL OF SEX RESEARCH, 47(6), 580–588, 2010
Copyright © The Society for the Scientific Study of Sexuality
ISSN: 0022-4499 print/1559-8519 online
DOI: 10.1080/00224490903216755



CULTURE, HEALTH & SEXUALITY, JANUARY-FEBRUARY 2004, VOL. 6, NO. 1, 19–29 Taylor & Francis healthsciences

HIV Tr:
D

PUBLIC HEALTH VERSUS PRIVATE FREEDOMS: The Regulation of Commercial Sex Establishments

by
Sheldon Bernard Lyke*

in Spotlight on Public Sex and HIV. (Center for HIV Information, UC-San Francisco). 2000.
<<http://hivinsite.ucsf.edu/InSite.jsp?doc=2098.42bc>>

Discurso de la salud pública vs. discurso de las libertades individuales

Rev Esp Salud Pública 2013; 87:367-382.

31/8 Julio-Agosto 2013

ORIGINAL

DISCURSOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD SEXUAL EN HOMBRES VIH-POSITIVOS QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (*)

Percy Fernández-Dávila (1,2) y Adriana Morales Carmona (1).

(1) Área de Investigación. Stop Sida. Barcelona, España

(2) Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Universitat Ramon Llull, Barcelona, España

Los autores declaran ningún tipo de conflicto de intereses, ya que no existe ninguna relación económica o de otra naturaleza que puedan haber influido en la realización del proyecto y en la preparación del manuscrito para su publicación.

(*) Estudio financiado por la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida del Ministerio de Sanidad y Consumo (SCO/1020/2007).

RESUMEN

Fundamentos: Entre los hombres VIH-positivos que tienen sexo con hombres (HSH VIH-positivos) se vienen reportando elevadas tasas de prácticas sexuales de riesgo, lo que lleva a preguntarse sobre las ideas del cuidado sexual que existen en este colectivo para evitar la transmisión y/o reinfección del VIH y otras ITS. Este estudio buscó comprender los discursos que sobre la responsabilidad sexual tienen estos hombres.

Método: Se realizó un estudio cualitativo. Participaron 78 hombres (27-65 años), 35 en entrevistas individuales y 43 en cinco grupos de discusión, en las ciudades de Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca, entre 2007 y 2008. Se estableció como criterio de selección que hubieran transcurrido 18 meses desde el diagnóstico del VIH. El enfoque utilizado para analizar los datos fue la Teoría Fundamentada.

ABSTRACT

Discourses on Sexual Responsibility in a Group of HIV-Positive MSM in Spain

Background: High rates of sexual risk behaviours are being reported among HIV-positive MSM which raises the question about the ideas of sexual responsibility that exist in this population to prevent the transmission and/or reinfection of HIV and other STDs. This study sought to understand the discourses on sexual care and responsibility in men living with HIV who have sex with men.

Methods: A qualitative study was carried out with 78 men (aged 27-65): 35 individual interviews and 43 in five discussion groups, in the cities of Barcelona, Madrid and Palma de Mallorca, between 2007 and 2008. The selection criterion was that eighteen months had passed after a HIV

Responsabilidad sexual

- Responsabilidad única (foco del discurso de la salud pública)
- Responsabilidad compartida
- Responsabilidad individual (discurso de muchos hombres gays que tienen el VIH)

Discurso se traslada en mensajes que pueden generar el efecto contrario

- “Tienes que usar condón para que no infectes a otros”.

vs.

- “Tienes que usar condón para que evites contraer una ITS (y tu carga viral se vuelva detectable) o que te puedas reinfectar de una cepa resistente y complique tu salud”.

ChemSex y VIH/VHC: Intervenciones con los profesionales de las unidades del VIH deben ser una prioridad.

A mí me atienden en el Hospital XXX, mi doctora siempre me juzga y me regaña. Me juzga y me habla de mala manera.

P: ¿Te juzga con respecto a qué?

Al uso del preservativo: 'otra vez te volviste a infectar de gonorrea, deberías parar ¡ya!', de hablarme así. He pensado algunas veces en cambiarme de doctora por otro doctor. ENT-08, 30 años, VIH-positivo, TD: 5 años.

El ChemSex ha sido declarado como un problema de salud pública.... ¿y?

ESP | ANE | BRA | CAT | ENG NEWSLETTER SUSCRÍBETE

EL PAÍS CATALUÑA

ANDALUCÍA CATALUÑA C. VALENCIANA GALICIA MADRID PAÍS VASCO MÁS COMUNIDADES TITULARES»

Barcelona incorpora el 'chemsex' por primera vez como un problema de salud pública

El Plan de Drogas del Ayuntamiento abordará el fenómeno tras atender en 2016 unos 200 casos de consumo problemático de sustancias para practicar sexo

JESSICA MUÑOZ QUINTANA
Barcelona • 18 SEP 2017 • 14:09 CEST



El psicólogo de BCH Checkpoint, Antoni Gata, atiende a un paciente en el centro comunitario CARLES RIBAS

NEWSLETTERS
Recibe la mejor información en tu bandeja de correo.

TE PUEDE INTERESAR

ESP | ANE | BRA | CAT | ENG NEWSLETTER SUSCRÍBETE

EL PAÍS MADRID

ANDALUCÍA CATALUÑA C. VALENCIANA GALICIA MADRID PAÍS VASCO MÁS COMUNIDADES TITULARES»

Madrid incorpora el 'chemsex' como un problema de salud pública

El Ayuntamiento invertirá 117 millones de euros hasta 2020 en el nuevo Plan de Adicciones

AGENCIAS
Madrid • 20 OCT 2017 • 10:38 CEST



Fotograma de la película 'Chemsex', de 2015.

NEWSLETTERS
Recibe la mejor información en tu bandeja de correo.

TE PUEDE INTERESAR

Respuesta de la salud pública

- Tardía, lenta, escasa y desde el desconocimiento.
- Abrir/implementar servicios de atención dirigidos a usuarios con consumo problemático.
- Formar a los profesionales de esos servicios socio-sanitarios.
- Es decir, se apuesta por un enfoque no prevencionista.
- Los hombres con consumo problemático son sólo una parte pequeña de los hombres que practican ChemSex. Las necesidades de la mayoría no están siendo atendidas.

Investigación y salud pública

- Para entender el ChemSex, primero, se tiene que captar lo que dicen los propios hombres que lo practican.
- Las intervenciones en salud pública se basan en estudios epidemiológicos.
- Si no sabemos qué cuantificar, no tendremos una figura aproximada sobre la magnitud de hombres que practican ChemSex.
- La atención del ChemSex en la agenda de la salud pública ha estado mediada por la influencia de los medios de comunicación.

Conclusiones

- El ChemSex es uno de los principales aspectos psico-sociales relacionados a la infección por el VIH/ITS, la salud mental y el bienestar de muchos hombres gais y otros HSH.
- El fenómeno del ChemSex no está bien entendido en Europa (incluido España).
- Los malentendidos/confusiones generan acciones que no corresponden al ejercicio de una buena praxis en la investigación ni en el abordaje de la salud pública.
- Se hace urgente y necesario que se incluya la perspectiva de la propia población que practica ChemSex en la investigación y en las intervenciones relacionadas al cuidado de la salud.